

Arañas

En nuestro país hay cuatro especies de arañas cuyas mordeduras pueden causar daños graves a las personas. Aún así, no son especies agresivas y sólo atacan si se sienten amenazadas. Por eso, es importante saber identificarlas y conocer sus hábitos.

Viuda negra o araña de lino (*Latrodectus Mirabilis*)



Mide aproximadamente 13 mm en la hembra,

siendo el macho 5 veces más chico.

Llama la atención su gran abdomen negro brillante, que tiene dos manchas rojo-naranja. Vive al aire libre, a nivel del suelo, en el pasto o en cultivos de lino o trigo como también se encuentra alrededor de las viviendas..

Araña del bananero (*Phoneutria kaiserlingi*)



Es una araña de gran tamaño, su cuerpo puede medir entre 35 y 50 mm. Su

coloración es marrón y marrón naranja. En el abdomen tiene un diseño similar a una fila de triángulos cuyos vértices están dirigidos a la parte anterior de la araña. Sus pelos son visibles a simple vista.

Araña domiciliaria (*Loxoceles Laeta*)

El tamaño de su cuerpo 15 mm en la hembra.

De color castaño naranja.

Se encuentra en los rincones oscuros, detrás de cuadros, debajo de muebles, en los lugares poco frecuentados de las casas o galpones...



Tarántulas (*Lycosa Raptoría*)

Es una araña de gran tamaño, su cuerpo puede llegar a los 28 mm. Su color varía entre el marrón y el negro y puede presentar dibujos negros y ocre.

Habita debajo de las piedras y puede entrar a las casas y galpones.

Son generalmente nocturnas y se desplazan rápidamente.



Abejas

Las abejas son insectos benéficos que cumplen un importante rol dentro del ecosistema (polinización, producción de miel, etc) y sólo se defienden picando.

COMO ACTUAR FRENTE A PICADURAS DE ABEJAS

- Alejarse rápidamente de la colonia de abejas.
- Retirar lo antes posible el aguijón. Hacerlo por arrastre y no tomarlo a manera de pinza con los dedos, porque al apretar las glándulas que siempre acompañan al aguijón, inyectaremos bruscamente toda la toxina que hay en ellas.
- Consultar inmediatamente al médico más cercano, pues pueden presentarse complicaciones en todo el organismo hasta aproximadamente 1 a 6 horas después de producida la picadura. Simultáneamente acercar una fuente de calor a la picadura (cigarrillo encendido, etc) sin llegar a quemar la piel; el calor inactiva la apitoxina (es termolábil).



QUE HACER FRENTE A UN ENJAMBRE O UNA COLMENA RÚSTICA

- No acercarse.
- No tocarlo, ni arrojarle objetos.
- Evitar el uso de sustancias que desprendan olores irritantes para las abejas (perfumes, combustibles, etc.).
- Consultar inmediatamente con un apicultor, para su captura o trasiego.
- Si está en un local escolar, esta operación deberá hacerse fuera del horario de clase.



EN CASO DE TENER QUE ELIMINAR LA COLMENA

- Si está ubicada en un predio escolar, hacerlo fuera del horario de clases.
- Alejar a los curiosos.
- Usar ropa adecuada, cubriendo todo el cuerpo, incluyendo guantes y gorro con careta para proteger la cara.
- Aplicar insecticida.

Víboras

En el Uruguay existen tres especies de ofidios ponzoñosos capaces de producir accidentes importantes. Todas las personas que transiten por pajonales, montes y bañados están expuestas a mordeduras de víboras

VÍBORA DE CASCABEL (*Crotalus dunssus terrificus*)

Tiene un cuerpo robusto y puede medir hasta m1.60 de longitud. Su color de fondo es castaño claro, con una serie de rombos más oscuros, delimitados por escamas blanquecinas. Tienen una estructura similar a un sonajero o cascabel en el extremo de la cola que agitan cuando están a punto de atacar, produciendo un sonido característico. Vive en cerros y montes pedregosos.

YARARÁ (*Bothrops neuwiedi pubescens*)

La Yará, es un poco más pequeña, llega hasta los 90 cms. de largo y es más irritable que la anterior. Su cuerpo es de color castaño grisáceo con manchas a lo largo de color castaño oscuro en forma de trapecio.



CRUCERAS

VÍBORA DE LA CRUZ (*Bothrops alternatus*)

De cuerpo robusto y que llega a medir hasta m1.50 de largo. Su color es pardo castaño con manchas a lo largo del cuerpo en forma de tubo de teléfono. Lo que la caracteriza es la mancha en forma de cruz que tiene en la cabeza.

VÍBORA DE CORAL (*Micrulis frontalis altirostris*)



Puede medir hasta m.1.80. Se caracteriza por sus anillos amarillos, negros, y rojos, alrededor del cuerpo. Habita en zonas rocosas, arenales y praderas.



Medidas Preventivas

- Saber identificarlas.
- Conocer su hábitat y costumbres.
- Observar cuidadosamente los lugares donde pueden esconderse, antes de removerlos.
- Para realizar tareas en lugares donde puedan encontrarse, usar siempre guantes gruesos de cuero o descarne, zapatos protectores o botas, camisa de manga larga y pantalón adecuado.

En caso de mordeduras

- Lavar la herida o zona afectada con abundante agua y jabón.
- Mantener el miembro afectado en posición de reposo.
- Trasladar a la persona al centro asistencial más próximo.
- En lo posible, capturar el ejemplar aunque haya sido destruido y llevarlo al centro asistencial ,para realizar el tratamiento correspondiente.

LO QUE NO DEBE HACERSE

- Incisiones.
- Succión en el punto de inoculación.
- Aplicación de torniquete.

IMPORTANTE

En ocasión de accidentes con animales ponzoñosos, especialmente ofidios, aplicar las medidas ya recomendadas y comunicar al

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN TOXICOLÓGICA

CIAT
Tel.1722

Programa
Análisis y Control de Situaciones de Riesgo

Dr. JORGE GARDARIÁN
Encargado


Pablo de María 1442 - Tel.2402.16.17 - E-mail:
programariesgos@adinet.com.uy



Administración Nacional
de Educación Pública
CODICEN

Programa: Análisis y Control de Situaciones de Riesgo

ANIMALES PONZOÑOSOS



Uno de los riesgos que implica el trabajo en el campo, son las lesiones producidas por animales ponzoñosos tales como arácnidos, ofidios e insectos, con los que hay que tener algunas precauciones.