

- 
- Traumatismo en dentición temporaria: el riesgo es el germen del diente permanente por su relación de vecindad con el diente caduco en el caso de pérdida del diente caduco se contraindica el reimplante.



---

Integrantes del departamento Odontológico:

Dra Ana María Palleiro

Dra Matilde De Armas

Dr Néstor Lorenzo

Dr Mauricio García

Dr Marcelo Muinelo

Dr Eduardo Sanchez

Asist dental Denise Demolin

Enc. Adm Adriana Menyou

Bibliografía: urgencia odontoestomatológica bases para su manejo  
E. Curuchaga año 1993

## Accidentes dentarios en la escuela

---

En la odontopediatría la salud no es una meta fugaz sino un estado que debe ser mantenido constantemente por el esfuerzo de niños, padres y profesionales.



Por urgencias llamar al departamento odontológico de UPS  
tel. : 23042762/61

Int 209

Agraciada 3253 - Montevideo - Uruguay

Los dientes traumatizados son un problema odontológico común y siempre deben ser considerados como situaciones de urgencia. Cuando el niño tiene edad escolar con frecuencia sufre traumatismos dentarios. Es importante los datos en el accidente:

- cómo
- dónde
- Cuándo

El cómo: nos dice si fue un golpe directo o indirecto. La higiene del elemento contundente que muchas veces se presenta Ferruginoso.

Si el daño no está en proporción con el tipo de trauma puede ser una situación de abuso infantil.

El dónde: el lugar nos brinda información sobre la posibilidad de contaminación.

El cuándo: es importante el tiempo entre el daño y el comienzo del tratamiento (nos afecta el pronóstico).

## Conductas a seguir frente a traumatismos dentarios

- Fracturas de estructuras dentarias : se guarda el trozo fracturado en leche y se lo deriva al odontólogo
- Movilidad de dientes: aflojamiento o desplazamiento de la pieza dentaria. Se lo deriva al odontólogo
- Lesiones de encía, de labios, de tejidos blandos. Se controla la hemorragia con gasa esterilizada y se deriva al odontólogo
- Pérdida del diente por traumatismo: generalmente son los incisivos superiores los que son perdidos, con frecuencia es sólo un diente, pero puede haber múltiples pérdidas.

Existen dos aspectos importantes en el éxito del tratamiento de un diente

perdido y son: las condiciones en las que se ha conservado y el tiempo transcurrido entre el accidente y la consulta.

El reimplante es la técnica mediante la cual se reinserta diente en su alvéolo lo más rápido posible. Su pronóstico decrece a medida que aumenta el tiempo de permanencia del diente fuera de la boca. Lo mejor es que se recolocque el diente enseguida y lo mantenga bajo ligera presión hasta llegar a la consulta. En el caso de que esté sucio no debe manipularse raspase o cepillarse, solo enjuagar con agua estéril nunca con desinfectantes. En el caso que no se pueda recolocar el diente se coloca en un recipiente con leche o agua destilada y se deriva rápidamente al odontólogo.